

Pain Assessment IN Advanced Dementia - PAINAD

|   | 0   | 1  | 2  | Score  |
|---|---|--|--|--------|
| Ademhaling                              | Normaal.  | Incidentele moeizame ademhaling.<br>Korte periode van hyperventilatie.                   | Luidruchtige moeizame ademhaling.<br>Lange periode van hyperventilatie.<br>Cheyne-Stokes-ademhaling. |        |
| Onrustgeluiden,<br>(negatieve geluiden) | Geen.   | Incidenteel kreunen of kermen.<br>Zacht spreken met een negatieve<br>of afkeurende toon. | Herhaaldelijk angstig uitroepen.<br>Luid kreunen of kermen.<br>Huilen.                               |        |
| Gezichtsuitdrukking                     | Glimlachend, of<br>nietszeggend (neutraal, ontspannen). | Droevig.<br>Bang.<br>Fronsen.  | Grimas.  |        |
| Lichaamstaal                            | Ontspannen.   | Gespannen.<br>Overstuur op en neer stappen, ijsberen<br>Zenuwachtig bewegen.             | Verstard. Gebalde vuisten.<br>Opgetrokken knieën.<br>Wegtrekken of wegduwen. Uithalen.               |        |
| Troostbaarheid                          | Niet nodig om te troosten.                              | Afgeleid of gerustgesteld<br>door stem of aanraking.                                     | Onmogelijk te troosten, af te<br>leiden of gerust te stellen.  |        |
|   |   |  |  | Totaal |

PAINAD (Warden, Hurley, Volicer, 2001) Dutch version (translation) by the University of Maastricht (Zwakhalen et al., 2004)